

あくね



7月
No. 196

第二回定期市議会

西目に保育所を新設

大川中屋体予定敷地も購入

第二回定期市議会は六月十五日から開かれ、一般会計七千八九二万円と畜場特別会計七一七万円などの追加予算が可決されました。



尻無に児童館

西目の飛松に市立保育所がつくられることになりました。場所は西目小学校長住宅附近で、敷地八一五平方メートル（二四七坪）の建物二四八平方メートル（六三坪）です。

収容人員は六〇人で、保育士さん三人、来年の四月から開設される予定になっています。大川には市立保育所がありますが、入所希望者が多くて、今度尻無の誕海寺附近に県下でも始めての試みである児童館ができます。

（予算を審議中の議会）

同じで、保母さんに該当する児童

食がないのと、午後からは小中学の児童は保育所とほとんど

市営住宅を六棟

今年度市営住宅は、第一種住宅（一〇坪）の建物一五八平方メートル（四八坪）となっています。

校の生徒も遊べることです。その

上夜間は婦人学級・青年学級・四

Hクラブ・婦人会などの各種団体が利用でき、児童を中心とした人づくり・村づくりなどに大いに活用することができます。

阿中校庭も拡張

阿久根中の校庭は生徒数に比べてせまかったので、南側の田を二五九〇平方メートル（二六畝五歩）購入して拡張します。

大川中も屋内運動場を建設する予定で、南側の田一〇三〇平方メートル（一反二二歩）購入することになりました。

田代中でも工作室用地として四五八平方メートル（四畝一九歩）三畝中も裏庭地として一六九〇平方メートル（一反七畝二歩）の購入がきました。

また阿久根中と三番中の給食用備品も、それぞれの業者と契約を結び、購入することになりました。

農業構造改善を推進

いよいよ条例をつくり農業構造改善事業を推進することになります。

委員も三〇人以内、市内農業団体関係者と学識経験者から、市長が委嘱し、会長・副会長を互選し、各自の運営を行ないます。事務局も市役所の農政課内に置かれることがあります。

市役所の機構に少し異動がありましたが、総務課から財政課が抜けたことになりました。

市長公室となり、財政課は管財課といつしょになって財政課となりました。

協本の小瀬と大川には第二種住宅がそれぞれ一棟の四戸づつ建てる予定です。

キヤンブ村
青木博子さん

南国交通勤務 21才

七月一日から大島のキヤンブ村が始まりました。

すでに県内外のキヤンブ客でにぎわっています。

むくむくと湧き出た入道雲の上に広がる真青な森、機具でも流したような細習の瀬、その間に島々の緑がひとさわ美しく映えています。

風光明媚な、この阿久根県立公園に、美しいガイドの明るい声がさらりと興をそえ、大島を廻の乗綱にしています。交通が発達し、道路がよくなりつつあるので、時間的に距離がぐんと縮まり、北九州を始め各方面からのキヤンブ客が多くなっています。

こんなキヤンブ女は、わたくしでも阿久根巾にとつてはいたいせつな顔光客です。

みんなでいたいせつにもなし阿久根での一日・大島での一夜が、この方々の楽しい思出となるよう、みんなで小さな親切をこころがけましょう。

空ビンの始末を確実に

農薬の危害防止

最近農作が続いているようですが、この裏には農薬の発達が大きな役割を果してます。

ですから、取扱いには注意しましょう。

注意書をよくみて

くみて、定められているとおりに

使用することです。

今年も農業を使う時期になってまいりました。

最近農業技術の発展とともに農薬が使用され、ますます各種の農薬が使用されるようになりました。

取扱いをたいせつに

ここ数年、相続する農作も天候の好条件に加えて、殺虫剤の適切な使用が、有力な原因の一つと認められています。

しかし一方、農薬は病害虫に対し、少量でも大きな効果を与えるものであると同時に、なかには使用者の人たちや家畜・魚貝類などに対して、毒性の強いものがあります。

使用はこれを使用する人たちだけでなく、一般の人やたいせつな家畜まで危険を及ぼします。



個人使用するつもりで持ち帰ったものが、ほとんど事故を起しています。

また農薬を食品の空ビンなどに移しかえたため、誤って食べ物にあります。

防除責任者は散布作業中の諸注意はもちろん、残液や空容器をしつかり始末することを忘れてはなりません。

毒物や劇物は法に定められた手続をとれば、個人でも購入でき

るし、普通農薬はいつでも購入で

きるので、いきおい農薬の恐ろし

さを忘れ、取扱いがおろそかにな

りがちです。

自殺者の大半が、無造作に放置してある農薬を見つけて、服毒す

るという例が多いようです。

納屋や馬小屋・床下などの、子

どもの手がとどきそうなところに

使い残した農薬がほってあるのを見かけますが、まことにあらぬ

ことです。

特定毒物はとくに毒性がはげし

いもので、皮膚に付着しても中毒

を起こす農薬です。

個人の購入や使用は禁止されて

いますが、ききめがひじょうに優

れていて、集団防除作業中に

使うことがあります。

それが医薬品としてPCP剤

見つかっています。

世の中がいやになつた人が、そ

ういう状態におかれている農薬

をみて、ついふらふら服毒する場

合も考えられますから、農薬はカ

ギのかかる場所に、「医薬用毒物

または劇物」と表示して、保管す

ます。

したがつて、不注意な取扱いや

使用はこれを使用する人たちだけ

でなく、一般の人やたいせつな家

畜まで危険を及ぼします。

このような事故が起きないよう

にして目的を果すには、農薬の化

学成分や使い方などの注意書をよ

学校給食婦募集

●受験資格

中学校卒業以上の学歴のある、阿久根市内居住の女子で、満二十五歳未満の人。

●提出書類

第一次(筆記)八月五日

第二次(面接)八月十五日

いずれも午前十時から、阿

久根市教育委員会事務局で

提出書類

●受付 七月三十一日まで

●提出書類

お知らせ板

保母の講習会

花電初級施設の保母
さんの講習会が行なわれます。

○受講資格

学校教育法による普
通認可高等学校を卒業
した人。またはこれと
同等以上の資格を有す

る人。

児童福祉法（保育所など）に
おいて、三年以上児童の保護に従
事していた人。

期間日 八月一日から七日まで

開会場 児童教育学部中央講堂

（鹿児島市上荒田町）

○講習料 一、〇〇〇円

○申込み方法

申込み用紙に記入捺印の上、受
講料・宛名記入の返信用封筒・切
手一〇円を封入して申込みください。

○申込み先

夏まけしやすい時期になりました。
た。健康な人でも疲れる時期です
から、弱い人にとっては、つゆの
あとで急に涼り付けるお天気は、
なのがこと良くなります。

わかりましたことですが、室内
の風通しをよくしてください。雨
風機は病人や赤ちゃんには直接受
てずに、一度壁に風を当ててから
もどってくるようにするのと、か
えつて広い範囲に刺激少ない風が
吹き出します。

衣 着いからといって裸は逆効
果です。日焼けし
て健康そだとはいいま
ら、中古しない人は調査からもれ
ていいぞ。

ただいま、田畠作農耕作育種推
進法や農地調整法により農地など
を譲り渡したり、買取されたりし
た旧地主の方の実態調査が行なわ
れています。

この調査は申告制でありますか

（福社事務所から）

人が、請求権の登録をすまされる
ようおすすめしています。

まだおみでない方は、早目に

もよりの支拂に手続きをしてくだ
さい。

（福社事務所から）

農地被買収者調査

（福社事務所から）

今が最適夏山手入

（福社事務所から）

今年は雨が多かったせいか、過
去の最適期です。

まだおみでない方は、早目に

もよりの支拂に手続きをしてくだ
さい。

（福社事務所から）

林地の草がのびています。今が夏
山手入れの最適期です。

まだおみでない方は、早目に

もよりの支拂に手続きをしてくだ
さい。

（福社事務所から）

下刈をしないと枯れてしまいます

（福社事務所から）

今年は雨が多かったせいか、過
去の最適期です。

まだおみでない方は、早目に

もよりの支拂に手続きをしてくだ
さい。

（福社事務所から）

たてて夏山手入れを実施してくだ
さい。新しく植林された山は、今
下刈をしないと枯れてしまいます

（福社事務所から）

今年は雨が多かったせいか、過
去の最適期です。

まだおみでない方は、早目に

もよりの支拂に手続きをしてくだ
さい。

（福社事務所から）

林地の草がのびています。今が夏
山手入れの最適期です。

まだ

農事メモ



(黒の瀬戸)

阿久根のむかしむかし (31)

隼人の瀬戸と大伴旅人

「一じや玄海灘

二じや千々岩灘

三じや薩摩の黒之瀬戸」

黒之瀬戸の渦巻と潮の流れの急なことは昔からあまりも有名で、ここを通った文人墨客などは、いろいろ歌に詠んでいます。

なかでも、今から1,200年前にできた「万葉集」に、隼人の瀬戸として、当時第一流の歌人であった大伴旅人は

隼人の瀬戸の岩はも貼走る

吉野の瀬になおしかずけり

と歌っています。

當時わたくしどもの祖先は隼人族といわれていたので、この瀬戸も「隼人の瀬戸」と呼ばれていたものであります。

大伴旅人は元来皇室の警備に当る貴族の家柄で、旅人は今の陸軍次官のような地位にありました。元正天皇の養老4年2月、大隅地方の隼人が天皇に反いたので、旅人はさっそく隼人討伐の大將軍に任命されて九州に下り、1年以上かかって隼人族を平定しました。

その後7年再び旅人は大字府の長官として九州に下りました。旅人は自ら國司を巡視するために、この黒之瀬戸を通ると、隼人の地は先年の大乱でもっとも関心の深いところであったので、夢にも忘れない都の吉野川を思い出すのでした。

そうして、「吉野の流れは鮎の住む急流で、この瀬戸の急な流れによくにているが懐しさの為この瀬戸よりも勝っているようである」と歌ったものです。

早期水稲 上旬までには播も出しますので、病害虫防除は徹底して実施してください。もしも病には水銀乳剤または粉剤を、もんがれ病にはゼンゼットアンシン粉剤を、出穗前10日目ごろと出穗後10日目ごろ2回はぜひ散布したいものです。

また七月はセジョウソウカやニ化メイ虫の発生が多くなりますのでじゅう分注意してください。

早期水稲 田植後のP.C.P.剤の使用については、最近方々で問題を起していますので、じゅう分注意を守って散布してください。使用後は10日間黄旗を立て水は絶対落さないようにしてください。

これは従来輸送そさいとして北九州や大阪の市場で好評を博してきたので、さらに増反と品質改善に努めてください。

種子はトマト7月下旬・キウリ7月中旬から8月中旬ごろまでま

すから、育苗にはじゅう分注意しビニールカンレシャ・竹スノコなどで日覆いや雨除けをかならずし

てください。

どんなそ葉も夏まきは、高温多湿台風と、気象的な災害または病害虫の発生が多いので、土じょう消毒・育苗・病害虫防除・敷ワラ

みの早生や志村みのわせを使用してください。

夏芽のエカヤ虫の防除は、硫酸ニコチン液を5日ごとに散布しま

す。カイロウ病の防除には、五三式ボルドー液を10日から2週間おきに散布してください。

病を未然に防ぐ根本的な対策といえるでしょう。

九州や長崎の市場で好評を博してきたので、さらに増反と品質改善に努めてください。

種子はトマト7月下旬・キウリ7月中旬から8月中旬ごろまでま

すから、育苗にはじゅう分注意しビニールカンレシャ・竹スノコなどで日覆いや雨除けをかならずしてください。

この夏芽をたいせつにしてください。夏芽を完全に伸ばすことによ

って、樹の成長がたいへん半められるものです。

夏芽のエカヤ虫の防除は、硫酸ニコチン液を5日ごとに散布しま

す。カイロウ病の防除には、五三式ボルドー液を10日から2週間おきに散布してください。

病を未然に防ぐ根本的な対策といえるでしょう。

用をおすすめします。追肥は植付後20から30日ごろが適期で、チッソ肥料を主体にします。

雨が多い年はナカジロンタバ

ンのまきどきです。

夏まきカンラン 今月下旬から八月にかけてが夏まきカンランのまきどきです。

人參大根類 人參は梅雨上りがまき時に発芽もいいです。黒田五寸などを早目にまいてください。

この夏芽をたいせつにしてください。夏芽を完全に伸ばすことによ

って、樹の成長がたいへん半めら

れるものです。

高溫乾燥の時期に発生する赤

ニは、本オサツビラン乳剤の千倍液またはフニンカブトン乳剤で防除します。サビダニにはアカル

乳剤を七月上旬に散布します。本

雨は日中の高溫時にはさけます。

天牛(テツボウ虫)も盛んに産卵して被害を与えてきます。土幹

に産卵防止剤の「ガムマーライト

」を撒ってください。

みかんの幼樹も夏芽が出ます。

この夏芽をたいせつにしてください。夏芽を完全に伸ばすことによ

って、樹の成長がたいへん半めら

れるものです。

高溫乾燥の時期に発生する赤

ニは、本オサツビラン乳剤の千倍液またはフニンカブトン乳剤で防除します。サビダニにはアカル

乳剤を七月上旬に散布します。本

雨は日中の高溫時にはさけます。

天牛(テツボウ虫)も盛んに産

卵して被害を与えてきます。土幹

に産卵防止剤の「ガムマーライト

」を撒ってください。

みかんの幼樹も夏芽が出ます。

この夏芽をたいせつにしてください。夏芽を完全に伸ばすことによ

って、樹の成長がたいへん半めら

れるものです。

高溫乾燥の時期に発生する赤

ニは、本オサツビラン乳剤の千倍液またはフニンカブトン乳剤で防除します。サビダニにはアカル

乳剤を七月上旬に散布します。本

雨は日中の高溫時にはさけます。

天牛(テツボウ虫)も盛んに産

卵して被害を与えてきます。土幹

に産卵防止剤の「ガムマーライト

」を撒ってください。

みかんの幼樹も夏芽が出ます。

この夏芽をたいせつにしてください。夏芽を完全に伸ばすことによ

って、樹の成長がたいへん半めら

れるものです。

高溫乾燥の時期に発生する赤

ニは、本オサツビラン乳剤の千倍液またはフニンカブトン乳剤で防除します。サビダニにはアカル

乳剤を七月上旬に散布します。本

雨は日中の高溫時にはさけます。

天牛(テツボウ虫)も盛んに産

卵して被害を与えてきます。土幹

に産卵防止剤の「ガムマーライト

」を撒ってください。

みかんの幼樹も夏芽が出ます。

この夏芽をたいせつにしてください。夏芽を完全に伸ばすことによ

って、樹の成長がたいへん半めら

れるものです。

高溫乾燥の時期に発生する赤

ニは、本オサツビラン乳剤の千倍液またはフニンカブトン乳剤で防除します。サビダニにはアカル

乳剤を七月上旬に散布します。本

雨は日中の高溫時にはさけます。

天牛(テツボウ虫)も盛んに産

卵して被害を与えてきます。土幹

に産卵防止剤の「ガムマーライト

」を撒ってください。

みかんの幼樹も夏芽が出ます。

この夏芽をたいせつにしてください。夏芽を完全に伸ばすことによ

って、樹の成長がたいへん半めら

れるものです。

高溫乾燥の時期に発生する赤

ニは、本オサツビラン乳剤の千倍液またはフニンカブトン乳剤で防除します。サビダニにはアカル

乳剤を七月上旬に散布します。本

雨は日中の高溫時にはさけます。

天牛(テツボウ虫)も盛んに産

卵して被害を与えてきます。土幹

に産卵防止剤の「ガムマーライト

」を撒ってください。

みかんの幼樹も夏芽が出ます。

この夏芽をたいせつにしてください。夏芽を完全に伸ばすことによ

って、樹の成長がたいへん半めら

れるものです。

高溫乾燥の時期に発生する赤

ニは、本オサツビラン乳剤の千倍液またはフニンカブトン乳剤で防除します。サビダニにはアカル

乳剤を七月上旬に散布します。本

雨は日中の高溫時にはさけます。

天牛(テツボウ虫)も盛んに産

卵して被害を与えてきます。土幹

に産卵防止剤の「ガムマーライト

」を撒ってください。

みかんの幼樹も夏芽が出ます。

この夏芽をたいせつにしてください。夏芽を完全に伸ばすことによ

って、樹の成長がたいへん半めら

れるものです。

高溫乾燥の時期に発生する赤

ニは、本オサツビラン乳剤の千倍液またはフニンカブトン乳剤で防除します。サビダニにはアカル

乳剤を七月上旬に散布します。本

雨は日中の高溫時にはさけます。

天牛(テツボウ虫)も盛んに産

卵して被害を与えてきます。土幹

に産卵防止剤の「ガムマーライト

」を撒ってください。

みかんの幼樹も夏芽が出ます。

この夏芽をたいせつにしてください。夏芽を完全に伸ばすことによ

って、樹の成長がたいへん半めら

れるものです。

高溫乾燥の時期に発生する赤

ニは、本オサツビラン乳剤の千倍液またはフニンカブトン乳剤で防除します。サビダニにはアカル

乳剤を七月上旬に散布します。本

雨は日中の高溫時にはさけます。

天牛(テツボウ虫)も盛んに産

卵して被害を与えてきます。土幹

に産卵防止剤の「ガムマーライト

」を撒ってください。

みかんの幼樹も夏芽が出ます。

この夏芽をたいせつにしてください。夏芽を完全に伸ばすことによ

って、樹の成長がたいへん半めら

れるものです。

高溫乾燥の時期に発生する赤

ニは、本オサツビラン乳剤の千倍液またはフニンカブトン乳剤で防除します。サビダニにはアカル

乳剤を七月上旬に散布します。本

雨は日中の高溫時にはさけます。

天牛(テツボウ虫)も盛んに産

卵して被害を与えてきます。土幹

に産卵防止剤の「ガムマーライト

」を撒ってください。

みかんの幼樹も夏芽が出ます。

この夏芽をたいせつにしてください。夏芽を完全に伸ばすことによ

って、樹の成長がたいへん半めら

れるものです。

高溫乾燥の時期に発生する赤

ニは、本オサツビラン乳剤の千倍液またはフニンカブトン乳剤で防除します。サビダニにはアカル

乳剤を七月上旬に散布します。本

雨は日中の高溫時にはさけます。

天牛(テツボウ虫)も盛んに産

卵して被害を与えてきます。土幹

に産卵防止剤の「ガムマーライト

」を撒ってください。

みかんの幼樹も夏芽が出ます。

この夏芽をたいせつにしてください。夏芽を完全に伸ばすことによ

って、樹の成長がたいへん半めら

れるものです。

高溫乾燥の時期に発生する赤

ニは、本オサツビラン乳剤の千倍液またはフニンカブトン乳剤で防除します。サビダニにはアカル

乳剤を七月上旬に散布します。本

雨は日中の高溫時にはさけます。

天牛(テツボウ虫)も盛んに産

卵して被害を与えてきます。土幹

に産卵防止剤の「ガムマーライト

」を撒ってください。

みかんの幼樹も夏芽が出ます。

この夏芽をたいせつにしてください。夏芽を完全に伸ばすことによ

って、樹の成長がたいへん半めら

れるものです。

高溫乾燥の時期に発生する赤

ニは、本オサツビラン乳剤の千倍液またはフニンカブトン乳剤で防除します。サビダニにはアカル

乳剤を七月上旬に散布します。本

雨は日中の高溫時にはさけます。

天牛(テツボウ虫)も盛んに産

卵して被害を与えてきます。土幹

に産卵防止剤の「ガムマーライト

」を撒ってください。

みかんの幼樹も夏芽が出ます。

この夏芽をたいせつにしてください。夏芽を完全に伸ばすことによ

って、樹の成長がたいへん半めら

れるものです。

高溫乾燥の時期に発生する赤

ニは、本オサツビラン乳剤の千倍液またはフニンカブトン乳剤で防除します。サビダニにはアカル

乳剤を七月上旬に散布します。本

雨は日中の高溫時にはさけます。

天牛(テツボウ虫)も盛んに産

卵して被害を与えてきます。土幹

に産卵防止剤の「ガムマーライト

」を撒ってください。

みかんの幼樹も夏芽が出ます。

この夏芽をたいせつにしてください。夏芽を完全に伸ばすことによ

って、樹の成長がたいへん半めら

れるものです。

高溫乾燥の時期に発生する赤

ニは、本オサツビラン乳剤の千倍液またはフニンカブトン乳剤で防除します。サビダニにはアカル

乳剤を七月上旬に散布します。本